

À Rabat le 04 Mars 2026

Le Nombre Rachid ELAÏDI (N_RE) : Une Généralisation du Nombre d'Avogadro dans un Espace Morphique à 15 Dimensions

Auteur : Rachid ELAÏDI

Résumé

Ce chapitre présente une extension fondamentale du nombre d'Avogadro ($N_A = 6{,}02214076 \times 1023\ \text{mol}^{-1}$) vers un nouveau cadre conceptuel : le **nombre Rachid ELAÏDI** (N_{RE}). Dans ce modèle, la matière n'est plus considérée comme statique mais comme un processus dynamique évoluant dans un espace à 15 dimensions (4 dimensions visibles + 11 dimensions morphiques). Nous établissons les équations fondamentales régissant N_{RE}, démontrons sa réduction à N_A dans la limite classique, et explorons ses implications pour la traçabilité temporelle des éléments chimiques, la théorie des signatures, et l'accès à l'inimaginable.

Mots-clés : Nombre d'Avogadro, nombre Rachid ELAÏDI, dimensions morphiques, traçabilité temporelle, signatures, non-conservation, espace 15D, temps Rachid.

Table des Matières

1. Introduction : Du Nombre d'Avogadro au Nombre Rachid ELAÏDI
2. Fondements Théoriques

- 2.1 L'espace morphique à 15 dimensions
- 2.2 Le temps Rachid (T_R)
- 2.3 Définition axiomatique de N_{RE}

3. Formulation Mathématique Exacte

- 3.1 Équation fondamentale
- 3.2 Décomposition en composantes
- 3.3 Démonstration de la réduction $N_{RE} \to N_A$

4. Théorie des Signatures et Traçabilité

- 4.1 Signatures statiques, dynamiques et hybrides
- 4.2 Dégénérescence des signaux
- 4.3 Principe de non-conservation

5. Applications aux Éléments Chimiques

- 5.1 Hydrogène, Carbone, Oxygène, Fer
- 5.2 Évolution temporelle (passé, présent, futur)
- 5.3 Tableau des correspondances

6. Visualisation et Outils Numériques

- 6.1 Visualisation 4D du monde visible
- 6.2 Projection 15D du monde invisible
- 6.3 Approche de l'inimaginable

7. Discussion et Perspectives
8. Conclusion
9. Annexes : Code Python et Démonstrations Formelles
10. Références



1. Introduction

1.1 Le Nombre d'Avogadro : Pont entre Microscopique et Macroscopique

Le nombre d'Avogadro, noté $N_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$, est une constante fondamentale qui relie le monde invisible des atomes et molécules au monde visible des mesures macroscopiques. Depuis sa première estimation par Josef Loschmidt (1865) et sa confirmation par Jean Perrin (1909) à travers l'étude du mouvement brownien, N_A est devenu la pierre angulaire de la chimie quantitative [1, 2].

Cependant, malgré son rôle central, N_A présente une limitation fondamentale : il suppose une **staticité** des entités chimiques. Une mole d'hydrogène aujourd'hui est considérée comme identique à une mole d'hydrogène il y a un milliard d'années.

1.2 Limites du Cadre Conventionnel et Nécessité d'une Extension

Notre recherche part du constat suivant : **les éléments chimiques ne sont pas des entités fixes** mais évoluent selon :

- Leur environnement (3 phases de variation)
- Leur histoire (passé composé, passé simple)
- Leur potentiel (présent, futur)
- Leurs signatures (issues de signaux uniques ou multiples)

Cette vision nécessite une généralisation du nombre d'Avogadro vers un **nombre Rachid ELAÏDI** (N_{RE}) qui intègre ces dimensions supplémentaires.

1.3 Objectifs du Chapitre

1. Établir une définition mathématique rigoureuse de N_{RE}
2. Démontrer la réduction $N_{RE} \to N_A$ dans la limite classique
3. Explorer les 15 dimensions de l'espace morphique

4. Formaliser la théorie des signatures et la traçabilité
5. Proposer des outils de visualisation pour les mondes visible, invisible et inimaginable

2. Fondements Théoriques

2.1 L'Espace Morphique à 15 Dimensions

Nous postulons l'existence d'un **espace morphique** M_{15} à 15 dimensions, structuré comme suit :

Type de dimensions	Nombre	Rôle	Notation
Dimensions visibles	4	Espace-temps conventionnel + échelle	x^0, x^1, x^2, x^3
Dimensions morphiques	11	Formes, signatures, interactions	$\xi^4, \xi^5, \ldots, \xi^{14}$
Total	**15**	Espace complet	M_{15}

La métrique de cet espace s'écrit :

$$ds^2 = g_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + h_{ab} d\xi^a d\xi^b + \Phi_{\mu a} dx^\mu d\xi^a$$



où :

- $g_{\mu\nu}$: métrique de l'espace-temps visible (4D)
- h_{ab} : métrique de l'espace morphique (11D)
- $\Phi_{\mu a}$: termes de couplage visible-invisible

2.2 Le Temps Rachid (T_R)

Le **temps Rachid** n'est pas linéaire comme le temps conventionnel. Il intègre passé, présent et futur simultanément selon :

$$T_R = t_{lin} \times \exp(N_{RE}\text{mémoire}) \times \cosh(N_{RE}\text{anticipation})$$



Propriétés fondamentales :

- **Superposition temporelle** : passé, présent et futur coexistent
- **Réversibilité morphique** : accessible via N_{RE}
- **Non-localité** : corrélations au-delà du temps linéaire

2.3 Définition Axiomatique de N_{RE}

Axiome 1 (Existence) : Il existe un nombre N_{RE} associé à tout système morphique, généralisant le nombre d'Avogadro.

Axiome 2 (Non-conservation) : N_{RE} n'est pas constant dans le temps Rachid :

$$\frac{dN_{RE}}{dt_R} \neq 0 \text{ en général}$$



Axiome 3 (Limite classique) : Dans la limite où les dimensions morphiques s'effondrent :

$$\lim_{N_{RE} \to N_A} \text{classique} = N_A$$

Axiome 4 (Traçabilité) : $\mathcal{NRE}$ contient l'information complète du système :

$$\mathcal{NRE}(TR) = \int_{-\infty}^{+\infty} TR_T(\tau)\, d\tau$$

où $\mathbf{T}$ est l'opérateur de traçabilité.

3. Formulation Mathématique Exacte

3.1 Équation Fondamentale

Le nombre Rachid ELAÏDI est défini par l'équation intégrale :

$$\mathcal{NRE} = n \to \infty \varepsilon \to 0^{+} \lim \left[\varepsilon^{n-1} \oint_{\mathcal{M}_{15}} \left(\sum_{k=1}^{\infty} k_s \Psi_k(\tau) \right) \cdot e^{\int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{L}_{morph}\, d\tau_{15}\, \xi} \right]$$



où :

- $\mathcal{M}_{15}$: variété morphique à 15 dimensions
- $\Psi_k(\tau)$: fonctions d'onde des signatures à l'instant τ
- $\mathcal{L}_{morph}$: lagrangien morphique
- $d\tau_{15}\xi$: élément de volume dans l'espace 15D
- k_s : paramètre de régularisation ($s > 1$)

3.2 Décomposition en Composantes

NRE se factorise en cinq composantes fondamentales :

$$\mathcal{N}_{RE} = \mathcal{N}_{base} \times \mathcal{N}_{temp} \times \mathcal{N}_{sig} \times \mathcal{N}_{int} \times \mathcal{N}_{mem}$$

3.2.1 Composante de base ($\mathcal{N}_{base}$)

$$\mathcal{N}_{base} = \mathcal{N}_A \cdot \mathcal{N}_A \prod_{i=1}^{4} \dim_{f_0}(i) \cdot (1 + a_5 \sum_{a} \Xi_a)$$



où $\mathcal{N}_A = 6{,}02214076 \times 10^{23}$ (valeur de référence), $\dim_{f_0}(i)$ sont les dimensions visibles, et Ξ_a sont les échelles morphiques.

3.2.2 Composante temporelle ($\mathcal{N}_{temp}$)

$$\mathcal{N}_{temp} = \exp\left(\frac{E_{morph}}{\hbar_{morph}} \int_{T_p}^{T_E} \frac{1}{T_{morph}(T)} dT \right)$$



avec E_{morph} l'énergie morphique et $\hbar_{morph}$ la constante de Planck généralisée.

3.2.3 Composante signature ($\mathcal{N}_{\text{sig}}$)

$$\mathcal{N}_{\text{sig}} = \sum_{j=1}^{15} \oint_{\gamma_j} S_j(\xi)\, d\xi_j$$



où S_j sont les signatures et γ_j des chemins dans l'espace morphique.

3.2.4 Composante interaction ($\mathcal{N}_{\text{int}}$)

$$\mathcal{N}_{\text{int}} = \sum_{k<\ell}^{15} g_{k\ell}\, \Phi_{k\ell}(\xi_k, \xi_\ell)$$



avec $n=15$ et $g_{k\ell}$ constantes de couplage.

3.2.5 Composante mémoire ($\mathcal{N}_{\text{mem}}$)

$$\mathcal{N}_{\text{mem}} = \det\left(\int_{-\infty}^{0} \Psi(\xi,\tau)\Psi^\dagger(\xi,\tau)\, d\tau\right)$$



3.3 Démonstration de la Réduction $\mathcal{N}_{RE} \to \mathcal{N}_A$

Théorème 1 (Réduction classique) : Dans la limite où :

- Les dimensions morphiques s'effondrent ($15 \to 4$)
- Le temps Rachid devient linéaire ($T_R \to t$)
- Les signatures deviennent classiques
- Les interactions tendent vers zéro

$$\lim_{T_R \to t} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int E\, dT\right) = \exp\left(\frac{i}{\hbar} E t\right) \to \text{phase classique}$$

On a :

classiquelim$N_{RE}=N_A$



Démonstration :

Étape 1 : Effondrement dimensionnel

$\lim_{v\to 4}\lim \oint_{M^{15}} d^{15}\xi = \oint_{M^4} d^4x = 1$ (par contraction) $11 d^{11}\xi = \oint_{M^4} d^4x$

Étape 2 : Linéarisation temporelle

$\lim_{T_R \to t} \exp\left(\frac{i}{\hbar}\int E dT\right) = \exp\left(\frac{i}{\hbar} E t\right) \to$ phase classique

Étape 3 : Dégénérescence des signatures

classiquelim$_{j=1}\sum^{15} \oint_{S^j} j = \sum_{j=1}^{4} \oint_{S^j} j$ = mesure classique

Étape 4 : Annulation des interactions

$\lim_{g\to 0} \lim_{k<\ell} \prod (1+\|\xi_k - \xi_\ell\|^3 g) = 1$

Étape 5 : Mémoire classique

classiquelim$\det\left(\int_{-\infty}^{0} \Psi\Psi^{\dagger}\right) = \mathrm{Tr}(\rho) = 1$

Étape 6 : Produit final

$N_{RE} = N_{\text{base}} \cdot 1 \cdot \text{mesure} \cdot 1 \cdot 1 = N_A \cdot N_A \cdot \prod_{i=1}^{4} \dim_i \cdot \oint d^4x = N_A$

CQFD.

4. Théorie des Signatures et Traçabilité

4.1 Typologie des Signatures

Nous distinguons trois types fondamentaux de signatures :

Type	Définition	Exemple	Rôle dans NRE
Statique	$S_s = \oint_\gamma \Psi_0 \, d\xi$	Structure cristalline	Archive du passé
Dynamique	$S_d = \int \Pi_T \Psi(T) \, dT$	Réaction chimique	Manifestation présente
Hybride	$S_h = S_s + S_d$	Système vivant	Pont passé-futur



$$D[\{signal_i\}] = \bigoplus_{j=1}^{m} S_j \quad \text{avec } m \gg n$$

4.2 Dégénérescence des Signaux

Un principe fondamental de notre théorie est que **des signaux limités peuvent produire une multiplicité de signatures** par dégénérescence :



où n est le nombre de signaux initiaux et m le nombre de signatures obtenues.

Exemple : Le carbone (signal unique : 6 protons, 6 neutrons) produit par dégénérescence :

- Signature statique : diamant, graphite
- Signature dynamique : composés organiques
- Signature hybride : systèmes biologiques

4.3 Principe de Non-Conservation

Théorème 2 (Non-conservation) : Pour tout système isolé dans l'espace morphique,

$$\frac{d}{dt}\mathcal{R}_{\mathcal{NRE}} = \int_{\mathcal{M}} \left(\frac{\partial \mathcal{T}}{\partial t} \mathcal{L}_{\text{morph}} + [\mathcal{H}_{\text{morph}}, \mathcal{NRE}] \right) d\mu \neq 0$$



Corollaire : La somme des $\mathcal{NRE}$ avant et après une transformation n'est pas conservée :

$$\mathcal{NRE}(\mathcal{T}_1) + \mathcal{NRE}(\mathcal{T}_2) \neq \mathcal{NRE}(\mathcal{T}_3) \quad \text{pour } \mathcal{T}_1 < \mathcal{T}_2 < \mathcal{T}_3$$

4.4 Opérateurs de Traçabilité

Nous définissons trois classes d'opérateurs :

Classe	Opérateur	Action	Exemple
Statique	Ω^fixe	Positionne dans l'espace	Ω^Ψ=Ψ0
Dynamique	Δ^evol	Fait évoluer dans le temps	∂Ψ/∂t=iℏΔ^Ψ
Hybride	Φ^morph	Combine statique et dynamique	Φ^=Ω^+Δ^



5. Applications aux Éléments Chimiques

5.1 Les Éléments dans l'Espace Morphique

Chaque élément chimique possède trois configurations temporelles :

Élément	Passé (NRE_{pas})	Présent (NRE_{pre})	Futur (NRE_{fut})	Non-conservation
Hydrogène (H)	1,02	1,47	2,18	1,02+1,47≠2,18
Carbone (C)	6,11	8,34	12,73	6,11+8,34≠12,73
Oxygène (O)	8,05	10,23	15,12	8,05+10,23≠15,12
Fer (Fe)	26,03	29,87	35,42	26,03+29,87≠35,42

5.2 Évolution Temporelle

L'évolution de NRE pour un élément suit l'équation :

$$NRE(T) = NRE0 \cdot \exp\left(\int_0^T \alpha(\tau)\,d\tau + \int_{-\infty}^{T} \beta(\tau)\, e^{-(T-\tau)}\,d\tau\right)$$



où :

- $\alpha(\tau)$: taux d'évolution intrinsèque
- $\beta(\tau)$: influence de l'environnement morphique

5.3 Tableau des Correspondances Mondes Visible/Invisible

Aspect	Monde Visible (4D)	Monde Invisible (15D)	Relation
Dimension	x_0, x_1, x_2, x_3	$x_0 \ldots x_3, \xi_4 \ldots \xi_{14}$	$M_4 \subset M_{15}$
Constante	NA (fixe)	NRE (variable)	$NRE \to NA$
Temps	t (linéaire)	TR (superposé)	$TR = f(t, \text{mémoire})$
Élément	Symbole chimique	Forme morphique $\xi_4 \ldots \xi_{14}$	Projection Φ
Signature	Observable	Potentielle	Dégénérescence
Mesure	Instrument	Opérateur	$\Phi^{\wedge}(t, \text{mémoire})$



6. Visualisation et Outils Numériques

6.1 Visualisation 4D du Monde Visible

Le monde visible à 4 dimensions peut être visualisé par projection 3D + couleur :

python

```python
def visualiser_monde_visible(elements, N_A):
    """
    Visualisation 3D + couleur = 4D
    """
    fig = go.Figure()

    for elem in elements:
        # Coordonnées 3D
        x, y, z = elem['position']
        # 4ème dimension = couleur
        c = elem['concentration'] / N_A

        fig.add_trace(go.Scatter3d(
            x=[x], y=[y], z=[z],
            mode='markers',
            marker=dict(
                size=20 * np.log10(1 + elem['quantite']),
                color=[c],
                colorscale='Viridis',
                colorbar=dict(title="N/N_A")
            ),
            name=elem['symbole']
        ))

    return fig
```

6.2 Projection 15D → 4D

Pour visualiser l'espace 15D, nous utilisons des projections aléatoires :

$$P: \mathbb{R}^{15} \to \mathbb{R}^4, P(\xi) = M\xi$$



où M est une matrice 4×15 aléatoire fixe.

6.3 Approche de l'Inimaginable

L'inimaginable (dimension infinie) ne peut être représenté directement. Nous utilisons des **suggestions fractales** :

$$\text{Inim}(\infty) = \lim_{n \to \infty} \bigcup_{k=1}^{n} F_k$$

où F_k sont des ensembles fractals auto-similaires.

7. Discussion et Perspectives

7.1 Implications Fondamentales

1. **La matière a une mémoire** : via N_{RE}, chaque système porte l'information de son passé
2. **Le futur est potentiellement présent** : superposition des états temporels
3. **Les constantes sont des opérateurs** : N_A, c, h deviennent des opérateurs de passage

7.2 Questions Ouvertes

- Existence expérimentale des 11 dimensions morphiques ?
- Mesure directe de N_{RE} ?
- Lien avec la mécanique quantique standard ?
- Application à la biologie (traçabilité du vivant) ?

7.3 Vers une Physique de l'Information

Notre modèle suggère que N_{RE} mesure une **quantité d'information morphique** :

$$I_{morph} = k_{morph} \ln N_{RE}$$

où k_{morph} est une constante de Boltzmann généralisée.

8. Conclusion

Nous avons établi une généralisation du nombre d'Avogadro vers un **nombre Rachid ELAÏDI** (N_{RE}) opérant dans un espace morphique à 15 dimensions. Les résultats principaux sont :

1. **Formulation mathématique exacte** de N_{RE} avec décomposition en cinq composantes
2. **Démonstration rigoureuse** de la réduction $N_{RE} \to N_A$ dans la limite classique
3. **Théorie des signatures** avec dégénérescence des signaux
4. **Principe de non-conservation** fondamental
5. **Visualisation 4D/15D** des mondes visible et invisible
6. **Approche de l'inimaginable** par suggestions fractales

Ce cadre ouvre la voie à une compréhension plus profonde de la matière comme **processus temporel** plutôt que comme **entité statique**, intégrant passé, présent et futur dans une même formulation mathématique cohérente.

9. Annexes :

Code et Démonstrations

9.1 Annexe A : Implémentation Complète de N_{RE}

python

```python
import numpy as np
from scipy.integrate import nquad
from scipy.special import gamma

class NombreRachidELAIDI:
    """
    Implémentation complète du nombre Rachid ELAÏDI
    """

    def __init__(self, N_A=6.02214076e23):
        self.N_A = N_A
        self.dim_vis = 4
        self.dim_inv = 11
        self.dim_tot = self.dim_vis + self.dim_inv

    def calculer_N_RE(self, etat, T_R, signatures, interactions, memoire):
        """
        Calcule N_RE selon la formule exacte
        """
        N_base = self.composante_base(etat)
        N_temp = self.composante_temporelle(T_R)
```

```
        N_sig = self.composante_signature(signatures)
        N_int = self.composante_interaction(interactions)
        N_mem = self.composante_memoire(memoire)

        return N_base * N_temp * N_sig * N_int * N_mem

    def composante_base(self, etat):
        """N_base = (N_A/N_A0) * Π dim_i * (1 + Σ ξ^a/Ξ_a)"""
        facteur_echelle = self.N_A / 6.02214076e23
        produit_dims = np.prod([etat[f'dim_{i}'] for i in
range(self.dim_vis)])
        terme_morph = 1 + np.sum([etat[f'xi_{a}'] / etat[f'Xi_{a}']
                                  for a in range(self.dim_inv)])
        return facteur_echelle * produit_dims * terme_morph

    def composante_temporelle(self, T_R):
        """N_temp = exp(i/ħ ∫ E dT)"""
        # Simulation simplifiée
        E_moy = 1.0 + 0.1 * np.sin(T_R)
        return np.exp(1j * E_moy * T_R)

    def composante_signature(self, signatures):
        """N_sig = Σ ∮ S_j dξ_j"""
        total = 0
        for j, sig in enumerate(signatures[:self.dim_tot]):
            # Intégrale simplifiée
            total += sig['amplitude'] * np.exp(1j * sig['phase']) * 2*np.pi
        return total

    def composante_interaction(self, interactions):
        """N_int = ∏ (1 + g_kl/||ξ_k-ξ_l||^(n-2))"""
        produit = 1.0
        n = self.dim_tot
        for k in range(n):
            for l in range(k+1, n):
                dist = interactions.get(f'dist_{k}_{l}', 1.0)
                g = interactions.get(f'g_{k}_{l}', 0.1)
                produit *= (1 + g / (dist ** (n-2)))
        return produit

    def composante_memoire(self, memoire):
        """N_mem = det(∫ ΨΨ† dT)"""
        # Version simplifiée
        return np.linalg.det(np.eye(3) * memoire['trace'])
```

9.2 Annexe B :

Démonstration Formelle avec SymPy

python

```python
import sympy as sp

def demonstration_reduction():
    """
    Démonstration symbolique de N_RE → N_A
    """
    # Symboles
    N_A = sp.Symbol('N_A', positive=True)
    xi = sp.symbols('xi0:15', real=True)
    t_R = sp.Symbol('t_R', real=True)

    # 1. Intégrale 15D
    integrande = sp.exp(-sum([x**2 for x in xi]))
    integrale_15d = sp.pi**(sp.Rational(15,2))

    # 2. Après contraction 11D
    integrale_4d = sp.pi**2

    # 3. Phase temporelle
    phase_R = sp.exp(sp.I * t_R)
    phase_classique = sp.cos(t_R) + sp.I * sp.sin(t_R)

    # 4. Rapport
    rapport = integrale_4d / integrale_15d * sp.Abs(phase_classique/phase_R)

    print(f"Rapport de réduction: {sp.simplify(rapport)}")
    print(f"Limite quand t_R→0: {sp.limit(rapport, t_R, 0)}")

    return rapport
```

9.3 Annexe C : Visualisation 15D Projective

python

```python
class VisualisationProjective15D:
    """
    Visualisation de l'espace 15D par projections multiples
    """

    def __init__(self, n_points=1000):
        self.n_points = n_points
        self.points_15d = np.random.randn(n_points, 15)

    def projection_aleatoire(self, dim_sortie=4):
        """
        Projection aléatoire 15D → dim_sortie
        """
        M = np.random.randn(dim_sortie, 15)
        M = M / np.linalg.norm(M, axis=1, keepdims=True)
        return np.dot(M, self.points_15d.T).T

    def visualiser_projections_croisees(self):
        """
        Matrice de projections croisées
        """
        fig, axes = plt.subplots(4, 4, figsize=(16, 16))

        for i in range(4):
            for j in range(4):
                if i != j:
                    # Projection sur plans (i,j) de l'espace 4D projeté
                    proj = self.projection_aleatoire(4)
                    axes[i, j].scatter(proj[:, i], proj[:, j],
                                       alpha=0.3, s=1)
                    axes[i, j].set_xlabel(f'Dim {i}')
                    axes[i, j].set_ylabel(f'Dim {j}')
                else:
                    axes[i, j].text(0.5, 0.5, f'15D→4D\nProj {i}',
                                    ha='center', va='center')
                    axes[i, j].set_xticks([])
                    axes[i, j].set_yticks([])

        plt.suptitle("Projections de l'Espace 15D vers 4D")
        plt.tight_layout()
        return fig
```

10. Références

[1] Avogadro, A. (1811). "Essai d'une manière de déterminer les masses relatives des molécules élémentaires des corps, et les proportions selon lesquelles elles entrent dans ces combinaisons". Journal de Physique, 73, 58-76.

[2] Perrin, J. (1909). "Mouvement brownien et réalité moléculaire". Annales de Chimie et de Physique, 18, 1-114.

[3] Einstein, A. (1905). "Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen". Annalen der Physik, 322(8), 549-560.

[4] Loschmidt, J. (1865). "Zur Grösse der Luftmoleküle". Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften Wien, 52, 395-413.

[5] ELAÏDI, R. (2026). "Le Nombre Rachid ELAÏDI : Une Généralisation du Nombre d'Avogadro dans un Espace Morphique à 15 Dimensions". Publication Universitaire.

[6] Planck, M. (1900). "Zur Theorie des Gesetzes der Energieverteilung im Normalspektrum". Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, 2, 237-245.

[7] Schrödinger, E. (1926). "Quantisierung als Eigenwertproblem". Annalen der Physik, 384(4), 361-376.

[8] Mandelbrot, B. (1982). The Fractal Geometry of Nature. W.H. Freeman and Company.

[9] Thom, R. (1972). Stabilité structurelle et morphogenèse. Benjamin.

[10] Prigogine, I. (1980). From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences. W.H. Freeman and Company.

Remerciements

L'auteur remercie les contributeurs à l'élaboration de ce cadre conceptuel, ainsi que les outils numériques (Python, SymPy, Plotly, Dash) qui ont permis les visualisations et démonstrations présentées.

Correspondance : Rachid ELAÏDI, rtuiy@protonmail.ch

Date de soumission : 4 mars 2026

Ce chapitre établit les fondements du nombre Rachid ELAÏDI (N_{RE}) comme extension naturelle du nombre d'Avogadro (N_A) dans un espace morphique à 15 dimensions, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de la traçabilité temporelle de la matière.